



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)

产品编号	产品名称	包装
P0948-200μl	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl
P0948-1ml	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	1ml

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L) (BeyoWB™ HRP-labeled Goat Anti-Rabbit IgG(H+L))主要作为二抗用于BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品(P0001/P0958), 匹配来源于兔的一抗。
- 本产品匹配BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品使用时, 推荐的稀释比例为1:500。如需根据具体实验情况调节稀释比例, 推荐的范围为1:250-1000。
- 按照每次需要5ml 1:500稀释的二抗计算, 本产品每200μl可以进行20次的BeyoWB™ 30分钟Western检测, 如果适当重复使用可以使用更多的次数。
- 本产品也可用于常规Western检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0948-200μl	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl
P0948-1ml	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	1ml
-	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。4°C保存, 3个月有效。

注意事项:

- 叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性, 在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 本产品的使用请参考BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(P0001)、BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用) (P0958) 相关实验步骤进行。起始稀释浓度按照产品简介中推荐的稀释比例进行稀释。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200μl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl/1ml
P0950	BeyoWB™ 封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™ 抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™ 洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™ 洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次